

PLANTES NOUVELLES, RARES OU CRITIQUES
DES SERRES DU MUSÉUM

(NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDOCHINE. XXIV)

Par A. GUILLAUMIN.

323. *Dendrobium ciliatum* Parish. — Laos : acheté au marché de Dalat (don de TIXIER à de SIGALDI n^o 224/Sig., f. 237, 1960).

Plantes à fleurs jaune pâle avec raies transversales du labelle violacées et cils jaune d'or.

347. *D. fimbriatum* Hook. — Annam : Dalat (de SIGALDI XI f. 25, 1956).

171. *D. Pierardii* Rosb. — Laos : Vientiane (TIXIER sp. n^o 7, f. 199, 1955).

320. *D. primulinum* Lindl. ? — Annam : 10 km. de Blao, le long du fleuve (HACK, *Dendrobium* n^o 14, 1958).

Le *D. primulinum* fleurit normalement sur des tiges défeuillées ; suivant HACK, la floraison de sa plante a lieu sur des rameaux longs de 0,50-2 m, épaisses de 0,8-1,5 cm, à quelques feuilles de 10 cm × 4 cm persistant encore au début de la floraison pour tomber ensuite quand les fleurs sont épanouies ; dans les serres du Muséum, elle s'est produite sur une tige longue de 30 cm environ entièrement feuillée. Sépales et pétales rose mauve pâle, labelle jaune très pâle rayé transversalement de violet surtout en dessus sur le disque, fimbrié sur les bords, onglet avec un épaississement transversal à la base et 3 côtes longitudinales peu saillantes (ornementations qui existent sur *D. primulinum* bien que décrits sommairement).

363. *D. Serra* Lindl. — Annam : Blao (de SIGALDI n^o 345/Sig., f. 181, 1960).

351. *Bulbophyllum nigrescens* Rolfe. — Annam : Dalat (TIXIER, n^o 20, f. 180, 1958).

388. *Doritis Wightii* Benth. — Annam : Dalat (TIXIER n^o 21, f. 180, 1958).

Abondamment répandu de l'Inde et de Ceylan jusqu'à la Péninsule malaise, pas encore signalé en Indochine.

389. *Ærides falcatum* Lindl. var. *Houlletianum* Veitch. — Annam : Dalat (C.R.S.T., f. 158, 1954).

390. *Æ. odoratum* Lour. — Annam : acheté au marché de Dalat (TIXIER n^o 65, f. 293, 1958).

Ensemble de la fleur rose pâle, sans taches violettes, pointillée de plus foncé vers les lobes latéraux du labelle.

391. *Luisia Psyche* Reichb. f. — Annam : Nhatrang : plantations de l'Institut Pasteur, sur *Hevea* (de SIGALDI n° 327/Sig., f. 223, 1960) ; Dalat (TIXIER XIV-xh, f. 178, 1956).

Tige vert noirâtre avec marbrures, feuilles nettement plus claires, atteignant 12 cm. de longueur, sépale supérieur jaune verdâtre, les latéraux divergents bruns, pétales 2 fois plus long, jaune verdâtre, labelle violet noir, capsules fortement côtelés, longues de 3,5 cm.

Pas encore signalée en Indochine.

392. *Sarcanthus flagelliformis* Rolfe ex Downie. — Annam : vallée de la Da-Houai, 250 m (TIXIER 46/60, f. 247, 1960).

Sépales et pétales brun rouge, éperon et lobe médian du labelle blanc pur, lobes latéraux du labelle et colonne jaunes.

N'avait encore été récolté qu'au Siam : Doi Sutep.

393. **Cleisostoma Tixieri** Guillaum. sp. nov.

Epiphytica, caudex 2 cm longus, 0,5 cm crassus ; foliis 4-5, linearibus (circa 10 cm × 1,5 cm) supra sulcatis, infra costatis, apice profunde emarginatis, lobulis uno acuto, altero rotundato. Inflorescentiae axillares, simplices, glabrae, 6 cm longae. floribus numerosis, 3 mm longis, albis labello violaceo tincto excepto, bracteis triangularibus, patulis, sepalis superiore ovato, apice rotundato, lateralibus triangularibus, acutis, petalis linearibus, acutis, sepalis brevioribus et multo angustioribus, labello 3-loba, lobis lateralibus erectis, rectangularibus, medio ovato, apice rotundato, patulo, basi callo cordato, minutissime papilloso ornato, calcare pendulo, apice rotundato, labelli lobo medio aequilongo ecalloso, columna brevi, anthera cordiformi, pollinibus 2, globosis, caudiculo brevi, retinaculo scutato.

Annam : Dalat (TIXIER 30/60, f. 239, 1960).

Se classe dans le même groupe que le *C. Poilanei* Gagnep. en raison de l'absence de callus au bord postérieur de l'ouverture de l'éperon.

PLANTES AUTRES QUE DES ORCHIDÉES.

394. *Hoya parasitica* Wall. — Laos : région de Ban Keun, forêt claire (de SIGALDI n° 309 pro parte, f. 12, 1957).

La figure 18 n° 13 de la *Flore d'Indochine* IV, p. 131 représente une forme de feuilles peu fréquentes ; celles-ci sont en général ovales comme le montrent le *Botanical Magazine* t. 4.437 et la *Flore des Serres* IV, t. 310 (sub. *H. cinnamomifolia* Hook.), le *Botanical Register* t. 951 et le *Floral Magazine* de PAXTON, t. 23 (sub. *H. pallida* Lindl.).

395. *Nepenthes Thorelii* H. Lec. — Annam : Dalat (TIXIER f. 244, 1957). N'avait encore été signalé qu'en Cochinchine et au Cambodge.

396. *Stemona tuberosa* L. — Annam : région de Phanrang, entre Carom et Kiên-Kiên, région très sèche (de SIGALDI n° 329/Sig., f. 223, 1960).

Sépales verdâtres striés de rouge, pétales verts, rhizomes analogues à ceux du Dahlia.

Rectifications.

266. La plante (GRILLET n° 84, f. 197, 1956) indiquée (*Bull. Mus.* 2^e sér., XXVIII, f. 484, 1956) connu *Dendrobium Parishii* Reichb. f. est : *D. superbum* Reichb. f. var. *Delacouri* Gagnep. et Guillaum.

270. La plante (de SIGALDI, *Bulbophyllum* XV et XVII, f. 25, 1956) indiquée (*l. c.* p. 460) comme *Cirrhopetalum bootanense* Griff. est : *C. bootanoides* Guillaum. mais le *C. bootanense* Griff. existe aussi en Annam (*C.R. S.T. Cirrhopetalum* n° 2, f. 158, 1954). Voir *l. c.* CXX, p. 486, 1958).

387. Au lieu de (de SIGALDI n° 235/Sig.) lire (de SIGALDI n° 325/Sig.).

Le Gérant : Jacques FOREST.